

Fungicida cúprico preventivo

Maxi Copper® WG

Fungicida para o controlo da gafa e olho-de-pavão da oliveira e do míldio da videira

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) contendo 200 g/kg ou 20% (p/p) de cobre (na forma de hidróxido)

Família química: Inorgânico

Número de AV: 1351

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 12 kg



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Maxi Copper® WG é um fungicida de superfície com atividade preventiva, inibindo vários processos metabólicos e atuando em diversas enzimas (multi-site).
- Maxi Copper® WG apresenta maior superfície específica, maior poder protetor, melhor aderência aos tecidos vegetais e melhor cobertura uniforme dos tecidos pulverizados.
- É uma formulação de preparação fácil e rápida sendo também mais segura para o aplicador.

CULTURA	DOENÇA	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	IS (dias)
VIDEIRA (UVA DE MESA E UVA PARA VINIFICAÇÃO)	Míldio (<i>Plasmopara viticola</i>)	375 g/hL ou 3,75 kg/ha	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes, iniciar os tratamentos logo após o aparecimento dos primeiros focos de míldio na região A persistência de ação é de 7 a 10 dias. Evitar aplicações durante a floração. Realizar no máximo 4 aplicações, por ano no mesmo solo agrícola, com este produto, não excedendo a dose de 4 kg de cobre/ha/ano, no conjunto dos produtos que contenham cobre.	21
OLIVEIRA (AZEITONA DE MESA E PARA PRODUÇÃO DE AZEITE)	Olho-de-pavão (<i>Fusicladium oleagineum</i>)	6 kg/ha	Realizar um tratamento na Primavera ao aparecimento da doença. Em anos de Primaveras muito chuvosas, se necessário, realizar outro tratamento passadas 3 semanas. Efetuar no máximo 1 tratamento de Primavera com este produto. No conjunto das doenças (olho-de-pavão e gafa) realizar no máximo 2 tratamentos por ano , um na Primavera e outro no Outono, no mesmo solo agrícola, com este produto, não excedendo a dose de 4 kg de cobre/ha/ano, no conjunto dos produtos que contenham cobre.	15
	Gafa (<i>Glomerella cingulata Colletotrichum acutatum</i>)		Realizar um tratamento de outono, à queda das primeiras chuvas outonais, se as condições decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, voltar a tratar passadas 3 semanas, com outro produto autorizado para a finalidade. Efetuar no máximo 1 tratamento de Outono com este produto. No conjunto das doenças (olho-de-pavão e gafa) realizar no máximo 2 tratamentos por ano , um na Primavera e outro no Outono, no mesmo solo agrícola, com este produto, não excedendo a dose de 4 kg de cobre/ha/ano, no conjunto dos produtos que contenham cobre.	15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- No mesmo solo agrícola, aplicar no máximo 4 kg de cobre/ha/ano, com este produto ou com qualquer outro produto contendo cobre.
- Este produto pode causar manchas nas uvas de mesa e afetar a vinificação nas uvas para vinho.
- Volume de calda: 500 - 1000 L/ha.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.



Videira/Míldio



Oliveira/Olho-de-pavão e Gafa

